

Научно Исследовательский Семинар


Понятие о математической
модели экономической системы.

Кольцов С.Н

www.linis.ru

Математическая модель и математическое моделирование

- **Объект** - система состоящая из множества элементов. Это может быть ракета, рынок ценных бумаг или популяции животных.
- Модель несет в себе отражение связей между элементами. **Математическая модель** – это математическое представление реальности.
- Учет связей между элементами характеризует **полноту модели**
- **Моделирование** - процесс расчета поведения системы на основе граничных условий и заданный связей между элементами системы.
- **Алгоритм** – логика расчета поведения системы. Логика может быть основана на разных математических подходах.



Модели основанные на дифференциальных уравнениях.

Математическое моделирование экономических и природных процессов приводит к необходимости решения уравнений, которые кроме независимых переменных и зависимых от них искомых функций, содержат также производные или дифференциалы от неизвестных функций. Такие уравнения называются дифференциальными.

Дифференциальные уравнения широко используются в моделях экономической динамики, в которых исследуются не только зависимость переменных от времени, а и от их взаимосвязи во времени.


Подобие между объектом и моделью

- **Физическое.** Объект и модель имеют сходную физическую природу.
- **Структурное.** Наблюдается сходство между структурой объекта и структурой модели.
- **Функциональное.** Объект и модель выполняют сходные функции при соответствующем воздействии.
- **Динамическое.** Существует соответствие между последовательно изменяющимися состояниями объекта и модели.
- **Вероятностное.** Существует соответствие между процессами вероятностного характера в объекте и модели.
- **Геометрическое.** Существует соответствие между пространственными характеристиками объекта и модели.



Этапы экономико – математического моделирования

- Идентификация объекта.
Определение основных параметров объекта.
- Оценка параметров модели.
Выбор переменных модели на основе параметров объекта.
- Спецификация модели.
Определение связей между параметрами. Построение уравнений.
- Проведения моделирования на основе заданных начальных условий.
- Анализ полученных результатов.



СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ

Если правая часть уравнения непрерывна
и имеет непрерывную частную производную $\frac{df}{dx}$ в области D , то решение данного

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x = x_0) = y_0 \end{cases}$$

уравнения с заданными начальными условиями существует и это решение единственно, то есть, через точку $y(x = x_0) = y_0$ проходит единственная интегральная кривая.

Важно также понимать, что теорема содержит только достаточные условия существования и единственности решения — при нарушении условий теоремы задача Коши может иметь или не иметь решений, может иметь несколько решений.

Модель Мальтуса

Пример из физики: Скорость распада атомов урана пропорционально числу частиц радиоактивного материала.

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\alpha N(t)$$

решение

$$N(t) = N(t = 0) \cdot e^{-\alpha t}$$

Пример из демографии: Скорость изменения населения пропорциональна численности населения умноженного на сумму коэффициентов рождения (α) и смертности (β).

$$\frac{dN(t)}{dt} = (\alpha - \beta) \cdot N(t)$$

решение



$$N(t) = N(t = 0) \cdot e^{(\alpha - \beta) \cdot t}$$

Модель предложена Мальтусом в 1798 г. в его классическом труде "О росте народонаселения".

Модель Мальтуса


Как бы быстро не увеличивалось производство продуктов питания и как бы медленно не росло население, эти прямые пересекутся, то есть определенное число людей будет неизбежно лишено продовольствия.

Если $(\alpha - \beta) > 0$ тогда население увеличивается.




Мальтус прав – Мальтус не прав


Темпы роста сельскохозяйственного производства растут




Рост населения мира, 1750–2050 гг.



Сокращение доли сельского хозяйства в ВВП стран мира



Темпы роста населения сокращаются




Демографические модели и гражданские войны в Африке

В книге 'Законы истории. Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального развития' авторы проанализировали связь между демографическим ростом, ВВП и политической стабильностью.

Корреляция между душевым потреблением продуктов питания (ккал в день) и уровнем политической стабильности

			Уровень душевого потребления, ккал / день / чел.			Итого
			<1850	1850–2000	>2000	
Уровень политической стабильности	Стабильная политическая обстановка	N	2	23	165	190
		%	16,7%	69,7%	90,7%	83,7%
	Государственный переворот или кровопролитные массовые беспорядки	N	6	7	15	28
		%	50,0%	21,2%	8,2%	12,3%
	Начало масштабной гражданской войны	N	4	3	2	9
		%	33,3%	9,1%	1,1%	4,0%
Итого		N	12	33	182	227
		%	100%	100%	100%	100%


Экономико-демографическая динамика Эфиопии в 1981–1991 гг.



Демографические модели и гражданские войны в Африке

В январе 1977 г.
правительство под
давлением
Международного
валютного фонда приняло
решение вдвое сократить
субсидии на товары
первой необходимости.
18—19 января по всей
стране прошли
многомиллионные
демонстрации. Они вошли
в историю страны как
«**хлебные бунты**»,

Экономико-демографическая динамика
Египта 1970–1982 гг.



МОДЕЛИ ЭВАНСА УСТАНОВЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ОДНОГО ТОВАРА

Цена товара является функцией от времени $p = p(t)$, $t \geq 0$.

Предложение является функцией от цены товара в момент времени

t и определяется формулой:

$$S = S(t) = S(p(t)) = a + bp,$$

Спрос является функцией от цены товара в момент времени t и

определяется формулой:

$$D = D(t) = D(p(t)) = c - dp$$

Цена товара выражается через спрос и предложение следующим образом:

$$\frac{dp}{dt} = \gamma(D(t) - S(t))$$

$$\frac{dp}{dt} = -\gamma(b + d)p + \gamma(c - a)$$

МОДЕЛИ ЭВАНСА УСТАНОВЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ОДНОГО ТОВАРА

Общее решение уравнения имеет вид:

$$p = \alpha e^{-\gamma(b+d)t} + \frac{c-a}{b+d}$$

При условии что $p(t=0) = p_0$

$$p(t=0) = \alpha + \frac{c-a}{b+d} = p_0$$

Решение задачи Коши будет (пределу при $t \rightarrow +\infty$):

$$p^* = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\left(p_0 - \frac{c-a}{b+d} \right) e^{-\gamma(b+d)t} + \frac{c-a}{b+d} \right] = \frac{c-a}{b+d}$$


предельная равновесная цена

МОДЕЛИ ЭВАНСА УСТАНОВЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ОДНОГО ТОВАРА

Спрос на картофель и его предложение

Величина предложения в неделю, т	Цена 1 кг/руб.	Величина спроса в неделю, т	Превышение величины спроса (+) и величины предложения (-)
5	5	10	+5
6	6	9	+3
7	7	8	+1
7,5	7,5	7,5	0
8	8	7	-1
9	9	6	-3
10	10	5	-5

Равновесная цена



Модель взаимодействия двух популяций (Модель Вольтера - Лотки).

К сожалению, решить эту систему уравнений аналитически, т.е. выразить $x_1(t)$ и $x_2(t)$ через известные элементарные функции, невозможно. Однако можно реализовать расчет на компьютере.

$$\frac{dN_2}{dt} = p_2 N_1 N_2 - d_2 N_2$$

$$\frac{dN_1}{dt} = r_1 N_1 - p_1 N_1 N_2$$


r_1 - рождаемость жертвы

p_1 - коэффициент хищничества для жертвы

d_2 - смертность хищника

p_2 - коэффициент хищничества

r_1	p_1	d_2	p_2
0,1	0.004	0,06	0.0007




Модель описание военных действий

В данной модели состояние системы описывается точкой (x, y) положительного квадранта плоскости. Координаты этой точки x и y – численности противостоящих армий.

$$\frac{dx}{dt} = -by, \quad \frac{dy}{dt} = -ax.$$

Здесь a и b – мощность оружия армии x и армии y , соответственно. Другими словами, каждый солдат армии x убивает за единицу времени a солдат армии y (и соответственно каждый солдат армии y убивает b солдат армии x). Таким образом, общая эффективность всех выстрелов армии x дается как ax , а для армии y – как by .



Методы и модели анализа прогнозирования экономических моделей

Два метода прогнозирования: 1. Количественное прогнозирование.
2. Качественное прогнозирование (опрос экспертов).

Сложности прогнозирования:

1. **Очень сложно сделать правдивый прогноз, особенно если он касается будущего.**
2. **Предсказать не сложно, сложно предсказать правильно☺**
3. **Числа, если их правильно преподнести, могут сказать о чем угодно.**

Количественное прогнозирование: 1. Каузальные модели (причинно – следственные).
2. Временные модели (например, модель Брауна).

Математическая постановка каузальной задачи $y = f(x_1, x_2, x_3...)$

Например: y – спрос на детскую еду, x – число детей, 1,2,3. – нумерация месяцев (лет)

или: y – спрос на медицинское оборудование, x – число больниц или поликлиник

Метод наименьших квадратов


Если некоторая величина зависит от другой величины, то эту зависимость можно исследовать, измеряя y при различных значениях x . В результате измерений получается ряд значений:

$$x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n;$$

$$y_1, y_2, \dots, y_i, \dots, y_n.$$

По данным такого эксперимента можно построить график зависимости

$y = f(x, a, b, c, \dots)$. Полученная кривая дает возможность судить о виде функции $f(x)$. Однако постоянные коэффициенты, которые входят в эту функцию, остаются неизвестными.



Метод наименьших квадратов для линейной функции

Аппроксимация наших данных, например линейной функцией можно выразить следующим образом:

$$\sum_{i=1}^n d_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (a + bx_i))^2$$

Суть метода НКв заключается в том что можно выбрать такие коэффициенты a, b , так что бы минимизировать квадрат разности между аналитической функцией и экспериментальными данными.

Что бы минимизировать квадрат разности нужно найти частные производные по коэффициентам a, b .

$$\sum_{i=1}^n -2(y_i - (a + bx_i)) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n -2x_i(y_i - (a + bx_i)) = 0$$

Метод наименьших квадратов для линейной функции

$$\sum_{i=1}^n -2(y_i - (a + bx_i)) = 0$$



$$a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - b \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\sum_{i=1}^n -2x_i(y_i - (a + bx_i)) = 0$$



$$b = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$

Метод наименьших квадратов


Проблема выбора степени полинома.

Собственно выбирая большую степень полинома мы будем увеличивать точность аппроксимации, то есть будет уменьшаться сумма квадратов.

Однако это приводит к тому что между точками будет возникать большие флуктуации.

Для того что бы выбрать 'наилучшее приближение' можно использовать следующее правило.

Нужно сравнивать среднее значения квадратов ошибок, то, есть для каждого приближения берется величина квадрата ошибки и делится на число точек минус число параметров. Чем меньше эта величина тем лучше.



Модель временных рядов.

В статистике под **временным рядом** понимаются последовательно измеренные через некоторые (зачастую равные) промежутки времени данные. **Анализ временных рядов** объединяет методы изучения временных рядов, как пытающиеся понять природу точек данных, так и пытающиеся построить прогноз. **Прогнозирование временных рядов** заключается в построении модели для предсказания будущих событий основываясь на известных событиях прошлого, предсказания будущих данных до того как они будут измерены. На пример — предсказание цены открытия биржи основываясь на предыдущей её деятельности.

Какие задачи здесь возникают?

1. Физика солнца: а) скрытые периодичности; б) прогноз активности.


Электрокардиограммы (ЭКГ): а) природа наблюдающихся аритмий;
б) прогноз развития состояния.

Экономические ряды: а) задача сегментации; б) задача прогноза.

Химическая кинетика: а) анализ динамики; б) построение модели.

Модель временных рядов.

Тренд (тенденция) - устойчивая закономерность, наблюдаемую в течении длительного времени. Например, демографическая характеристика или рост потребления.



Сезонная компонента - функция, которая характеризует сезонные колебания. Как правило это колебания носят периодический или почти периодический характер, например загруженность дорог, пик продаж товаров.

Циклическая компонента - функция, описывающая длительные периоды (более года) спада или подъема. примером таких колебаний являются волны Кондратьева, демографические ямы.


Случайная компонента - шум, который отражает случайное действие многочисленных факторов.

Скользящее среднее.

Метод скользящего среднего заключается в том что предсказанное значение вычисляется как среднее арифметическое по трем предыдущим данным:

Этот метод годится для медленно меняющихся кривых, с небольшой шумовой компонентой.

$$\hat{y}_{t+1} = \frac{1}{n}(y_t + y_{t-1} + \dots + y_{t-n+1})$$




Взвешенное скользящее среднее.

Метод взвешенного скользящего среднего заключается в том что предсказанное значение вычисляется как среднее арифметическое по трем предыдущим данным, при этом каждое из трех величин умножается на веса. Сумма весов должна быть равна единице.

Например

$$\hat{y}_7 = \frac{3}{6}y_6 + \frac{2}{6}y_5 + \frac{1}{6}y_4.$$

$$\hat{y}_7 = \alpha_1 y_6 + \alpha_2 y_5 + \alpha_3 y_4,$$



Экспоненциальное сглаживание (Модель Брауна).


Модель экспоненциального сглаживания отличается от метода взвешенного скользящего среднего выбором коэффициента:

где $\hat{Y}_t$ предсказанное значение за прошлую дату

$$\hat{Y}_{t+1} = \hat{Y}_t + \alpha(Y_t - \hat{Y}_t)$$

Идея метода заключается в том, что прогнозное значение определяется через предыдущее спрогнозированное значение, но скорректированное на величину отклонения факта от прогноза

$$\hat{Y}_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha)\hat{Y}_t$$




Экспоненциальное сглаживание (Модель Брауна).

Очевидно, что величина α сильно влияет на результат сглаживания. Рассмотрим как метод сглаживания влияет на три ситуации.

1. Реакция сглаживания на скачок.

Чем меньше значение α тем хуже результат (ряд 2).



THANK YOU!

← → ↻ 🏠 linis.hse.ru/o-nas

🔍 ☆ Ⓢ ☰



→ [НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге](#) → [Лаборатория интернет-исследований](#) → О нас

RU EN



О нас >

Мероприятия >

Исследования >

Ссылки >

Программное
обеспечение >

Публикации >

Материалы >

Работа и
стажировки в
ЛИНИС >

О нас

Лаборатория Интернет-исследований — это...

— это [команда исследователей](#), протянувших друг другу руки через дисциплинарные границы, чтобы получать новое знание о таких явлениях, которые не видны из узких колодцев отдельных наук. Миссия лаборатории — изучать интернет как уникальный феномен, имеющий социально-политическое, экономическое, лингвистическое и техническое измерения. Мы также стремимся узнать больше об обществе, для которого интернет стал естественной «средой обитания». Для этого мы разрабатываем и адаптируем математические методы, алгоритмы и [программное обеспечение](#). Все наши [проекты](#) коллективны и включают людей с разными компетенциями и разного уровня — от студентов-бакалавров и аспирантов до опытных исследователей, что обеспечивает взаимообогащение и обмен идеями. Мы поддерживаем креативную обстановку и равноправную коммуникацию в лаборатории, приветствуем новые инициативы и сотрудничество с бизнесом и государственными органами, а также проводим множество [мероприятий](#). Результаты наших усилий можно увидеть в наших [публикациях](#).